

FICHE DE SOINS

Traitement antibiotique

BAYTRIL 5 %



Laboratoire BAYER

Usage vétérinaire.

Traitement

Utilisé le plus souvent contre les affections respiratoires (notamment chez le genre *Graeca*), mais il convient aussi pour les traitement des septicémies ou autres infections.

Informations.

La molécule active est l' ENROFLOXACINE, c'est un anti infectieux bactéricide qui appartient à la famille des Fluoroquinolones. Son spectre d'action est large, essentiellement les bactéries GRAM + et les mycoplasmes.

Posologie

5mg/kg/j → 1ml/10kg/j → Pendant 8 à 10 jours

La posologie peut être doublée en fonction de la gravité de la pathologie

Un traitement avec aérosols (Antibiotiques+corticoïdes) peut être associé pour lutter contre la pneumonie et la détresse respiratoire.

Administration intramusculaire

Poids Kg	Posologie ml, mg.	Graduations seringue insuline
3	0.3 ml - 20 mg	12 Graduations
2.5	0.25 ml - 15 mg	10 Graduations
2	0.2 ml - 10 mg	8 Graduations
1.5	0.15 ml - 7.5 mg	6 Graduations
1	0.1 ml - 5 mg	4 Graduations
0.500	0.05 ml-1 mg	2 Graduations
0.250	0.025 ml-0.5 mg	1 Graduation
0.125	ml-mg	à diluer
0.050	ml-mg	à diluer
0.025	ml-mg	à diluer

Attention :

Changement de dosage des seringues à insuline depuis Janvier 2001.

Anciennes seringues : 40 UI = 1 ml ou 4 UI = 0.1 ml

Nouvelles seringues : 10 UI = 0.1 ml = 4 Graduations

Attention :

Le Baytril (donc le Marbocyl de même) est dangereux pour certaines espèces, notamment *Intestudo elongata* et *Geochelone elegans*.

Pour les tortues boîtes (notamment les terrapenes), il faut diminuer les doses de moitié et effectuer les injections toutes les 96 heures.