

FICHE DE SOINS
Traitement antibiotique
MARBOCYL ® FD 2 % (20 mg/ml)



Laboratoire VETOQUINOL S.A.
Usage vétérinaire.

Traitement

Utilisé le plus souvent contre les affections respiratoires (notamment chez le genre *Graeca*), mais il convient aussi pour les traitement des septicémies ou autres infections (Idem que le BAYTRIL).

Informations

La molécule active est la MARBOFLOXACINE, c'est un anti infectieux bactéricide qui appartient à la famille des Fluoroquinolones. Son spectre d'action est large, essentiellement les bactéries GRAM + (*Staphylococcus*, *Streptococcus*) GRAM – (*E. coli*, *Pasteurella*) et les mycoplasmes.

Posologie

2mg/kg → 0.1ml/kg → Tous les 2 jours pendant 8 à 10 jours

Administration sous-cutanée ou intramusculaire. Absorption rapide

Remarque :

Après ouverture, le flacon se conserve 1 mois à température inférieure à 25°C.

Poids Kg	Posologie ml, mg.	Graduations seringue insuline
3	0.3 ml - 6 mg	12 Graduations
2.5	0.25 ml - 5 mg	10 Graduations
2	0.2 ml - 4 mg	8 Graduations
1.5	0.15 ml - 3 mg	6 Graduations
1	0.1 ml - 2 mg	4 Graduations
0.500	0.05 ml - 1mg	2 Graduations
0.250	0.025 ml – 0.5mg	1 Graduation
0.125	ml - mg	à diluer
0.050	ml - mg	à diluer
0.025	ml - mg	à diluer

Remarque :

Changement de dosage des seringues à insuline depuis Janvier 2001.

Anciennes seringues : 40 UI = 1 ml ou 4 UI = 0.1 ml

Nouvelles seringues : 10 UI = 0.1 ml = 4 Graduations

Attention :

Le Baytril (donc le Marbocyl de même) est dangereux pour certaines espèces, notamment *Intestudo elongata* et *Geochelone elegans*.

Pour les tortues boîtes (notamment les Terrapenes), il faut diminuer les doses de moitié et effectuer les injections toutes les 96 heures.

Marbocyl ® 2% → (20 mg/ml)