

FICHE DE SOINS

Panacur 2.5 % (liquide)
Panacur 250 mg (pour 1 comprimé)



Laboratoire HOECHST ROUSSEL
Usage vétérinaire.

Traitement

Il détruit uniquement les nématodes, il peut être utilisé avec le Flagyl qui agit contre les protozoaires.

Informations

La molécule active est le FENBENDAZOLE, c'est un anthelminthique polyvalent.
Action efficace sur les nématodes et les cestodes.

Posologie : Attention 2 posologies

50mg/kg → **2ml/kg** → 1 fois par jour pendant 3 jours
100mg/kg → **1comprimé** → 1 fois par jour pendant 3 jours

Renouveler 10 à 15 jours plus tard.

Administration par voie orale ou sonde oro-gastrique.

Poids Kg	Posologie ml, mg. liquide	Posologie ml, mg. comprimé
3	6 ml - 150 mg	2 comp. 500mg
2.5	5 ml - 125 mg	1+1/2 comp. 375mg
2	4 ml - 100 mg	1 comp. 250mg
1.5	3 ml - 75 mg	3/4 comp. 188mg
1	2 ml - 50 mg	1/2 comp. 125mg
0.750	1.5 ml - 37.5 mg	Utiliser le liquide
0.500	1 ml - 25 mg	Utiliser le liquide
0.250	0.5 ml - 12.5 mg	Utiliser le liquide
0.125	0.2 ml - 6.25 mg	Utiliser le liquide

Remarque :

La posologie est différente si on utilise le Panacur liquide ou comprimé ; Pour les tortues dont le poids est supérieur à 1 kg, l'idéal est d'utiliser le Panacur en comprimé.

Attention :

Panacur à 2.5%

Panacur comprimé à 250 mg